

檢驗結果的意義

♥ 陽性反應

尚不能確認感染愛滋病毒，需再做西方墨點法確認，如西方墨點確認陽性，則由衛生局輔導轉介愛滋病指定醫院，做進一步的檢查與諮詢，並鼓勵其性伴侶一同前來篩檢。

♥ 陰性反應

可能處於空窗期，不能完全排除感染，建議個案3個月再篩檢一次，期間請避免捐血或發生危險性行為。

愛滋病毒抗體篩檢，
檢驗時間需3天~1週！



檢驗結果他人會知道嗎？

醫護人員都必須遵守「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」第14條規定，檢驗結果只會通知篩檢本人，因此不必擔心您的個人資料會外洩。

停止愛滋，
針頭、針筒及
稀釋液不共享！



篩檢服務地點

● 本市30區衛生所及愛滋病匿名篩檢單位或請至臺中市政府衛生局愛滋病防治宣導網頁查詢。
(<http://aids.health.taichung.gov.tw/>)

● 全國的服務地點請至衛生福利部疾病管制署網頁(www.cdc.gov.tw)查詢或撥打愛滋病諮詢專線1922



衛生福利部疾病管制署
臺中市政府衛生局

愛滋病

篩檢與諮詢



愛滋病毒的傳染途徑
有三種：**體液感染**
(含肛交、陰道交、口交)
血液交換傳染、
母子垂直感染。



篩檢適當時機

在感染愛滋病毒的早期(約3個月)，因抗體尚未產生，血液中偵測不到病毒，檢驗結果會呈現陰性反應(所謂的空窗期)，故正確的篩檢時間為危險行為日算起3個月後，例如3月1日發生不安全性行為，須等到6月1日再接受篩檢，如此檢驗結果才是正確的。



哪些人需要接受愛滋病毒檢驗？

- 1 未全程戴保險套之性行為
- 2 對您的性伴侶有疑慮時
- 3 嗑藥時發生不安全性行為
- 4 與愛滋病感染者發生不安全性行為
- 5 與多位或不熟識性伴侶發生不安全性行為
- 6 注射毒品者或與他人共用針具、稀釋液及容器
- 7 染有性病的人



1 說明：
不安全性行為：指發生性行為時，
未全程正確使用保險套



篩檢方式

篩檢方式有具名及匿名兩種，如果您曾有危險行為，想知道自己有沒有被感染愛滋病毒，又擔心身份曝光，您可以考慮匿名篩檢。

匿名篩檢是指您接受愛滋病篩檢服務時，不需提供姓名、地址、聯絡電話，醫護人員會給您一個代碼，跟您約定幾天後，由您主動打電話詢問檢驗結果。

